COLON POR ENEMA DOBLE CONTRASTE

Preparación para el examen

Para la preparación se requiere tres días
Si es niño menor de tres años no requiere preparación
Si el paciente tiene falla cardiaca, renal, desequilibrios electrolíticos en fósforo o en calcio, obstrucción del colon, es menor de 12 años o está en embarazo, tiene que consultar al médico tratante antes de realizar esta preparación

Primer día:

- Debe tener dieta líquida (puede consumir consomé líquido, gelatina, aromática, te en agua, no consumir derivados lácteos)

Segundo día:

- Debe seguir con la dieta líquida
- A las 8:00 PM se debe tomar la mitad de un frasco de laxante oral por 133 miligramos (sugerimos TRAVAD) mezclado con jugo de naranja o limón y a la media hora la otra mitad igualmente mezclada; en pacientes de tres a doce años, se administra un cuarto de laxante en la primera dosis y a la media hora el cuarto restante. Colocar enema rectal la noche anterior al examen y uno en la mañana del día del examen

Tercer día: (día del examen)

- Asistir totalmente en ayunas
- Para pacientes hospitalizados y/o urgencias, el personal de radiología informara al paciente o a su acompañante sobre la adquisición y costo del medicamento y la bolsa con el sulfato de bario

Requisitos

- Debe presentarse en ventanilla de admisiones del servicio de Radiología con 30 minutos de anticipación a la hora de la cita de con orden médica y autorización vigente del procedimiento
- Para pacientes hospitalizados y urgencias se indicará preparación, previo llamado del servicio
- Para la realización del examen el paciente debe traer una bolsa para colon por enema pre llenada de sulfato de bario (en polvo).
- Asistir con exámenes previos si tiene (no aplica para pacientes hospitalizados y urgencias)

COLANGIOGRAFÍA POR TUBO EN "T"

Preparación para el examen

- El día del examen tener ayuno mínimo de 8 horas.

Requisitos

- Debe presentarse en ventanilla de admisiones del servicio de Radiología con 30 minutos de anticipación a la hora de la cita de con orden médica y autorización vigente del procedimiento
- Para pacientes hospitalizados y urgencias se indicará preparación, previo llamado del servicio.
- Asistir con exámenes previos si tiene (no aplica para pacientes hospitalizados y urgencias)

COLANGIOGRAFÍA (CPRE)

Preparación para el examen

- El paciente debe ser valorado por el especialista con reportes de laboratorio y demás exámenes que confirmen que necesita del procedimiento, (Pruebas Hepáticas, Pruebas de coagulación, ecografía o TAC de vías biliares).

- Ser valorado por el anestesiólogo el día anterior al examen y obtener de esta autorización para que pueda practicar bajo anestesia general.

- El paciente debe asistir sin esmalte, ni maquillaje.

- Debe informar al especialista o a la enfermera sus antecedentes médicos de importancia, como enfermedades, tratamientos farmacológicos (en especial si está tomando anticoagulantes como Warfarina o Coumadin).

- Si presenta alergias a medicamentos o sobre cualquier situación que considere debe conocer la hora y día de su estudio previa confirmación de los procesos administrativos.

- Debe venir con un acompañante.

Requisitos

- Debe presentarse en ventanilla de admisiones de consulta externa con 30 minutos de anticipación a la hora de la cita de con orden médica y autorización del procedimiento

HISTEROSALPINGOGRAFÍA

Preparación para el examen

- La paciente asistirá con la vejiga vacía

Requisitos

- Debe presentarse en ventanilla de admisiones del servicio de Radiología con 30 minutos de anticipación a la hora de la cita de con orden médica y autorización vigente del procedimiento
- Para pacientes hospitalizados y urgencias se indicará preparación, previo llamado del servicio
- Traer prueba de embarazo
- Asistir con exámenes previos si tiene (no aplica para pacientes hospitalizados y urgencias)

TAC DE CRÁNEO CONTRASTADO

Preparación para el examen

- Debe traer pruebas de función renal (creatinina y Bun) para realizar depuración. En caso que el valor de la depuración salga inferior al control establecido se debe nefroproteger al paciente.
- 8 horas de ayuno

El protocolo de nefroprotección indicado es

- Ingerir un vaso con agua 24 horas antes del examen cada 2 horas
- Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con agua 12 horas antes del examen
- Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con agua 6 horas antes del examen
- Para pacientes hospitalizados o de urgencias la nefroprotección la definirá el médico tratante
- Si el paciente consume METFORMINA, esta debe suspenderse 24 horas antes del examen
- Se debe realizar un nuevo examen 48 horas después de la inyección de medio de contraste para verificar que los valores de creatinina no se hayan alterado, si la creatinina es normal puede volver a consumir el medicamento (metformina), si se ve alterado el resultado de la creatinina (mayor al rango normal) el paciente debe consultar con su médico tratante para que este le estabilice los valores de función

- Para realizar el procedimiento el paciente requiere un acceso venoso periférico de grueso calibre; este acceso se realizara en el servicio de radiología para pacientes ambulatorios

- Para pacientes hospitalizados o de urgencias el acceso venoso se realizara con las características nombradas por parte del servicio solicitante

Requisitos

- Debe presentarse en ventanilla de admisiones del servicio de Radiología con 30 minutos de anticipación a la hora de la cita de con orden médica y autorización vigente del procedimiento

- Para pacientes hospitalizados y urgencias se indicará preparación, previo llamado del servicio

- Asistir con exámenes previos si tiene (no aplica para pacientes hospitalizados y urgencias)

- Debe asistir con ayuno de 8 horas

TAC DE SILLA DE TURCA (HIPÓFISIS)

Preparación para el examen

- Asistir con exámenes previos si tiene
- Debe asistir con ayuno de 8 horas
- Debe traer pruebas de función renal (creatinina y Bun) para realizar depuración
- En caso que el valor de la depuración salga inferior al control establecido se debe nefroproteger al paciente

El protocolo de nefroprotección indicado es:

- Ingerir un vaso con agua 24 horas antes del examen cada 2 horas
- Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con agua 12 horas antes del examen
- Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con agua 6 horas antes del examen
- Si el paciente es diabético y toma un medicamento llamado METFORMINA (glucopague) debe suspenderlo 24 horas antes
- Se debe realizar un nuevo examen 48 horas después de la inyección de medio de contraste para verificar que los valores de creatinina no se hayan alterado, si la creatinina es normal puede volver a consumir el medicamento (metformina), si se ve alterado el resultado de la creatinina (mayor al rango normal) el paciente debe consultar con su médico tratante para que este le estabilice los valores de función

PREPARACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS DE RADIOLOGÍA

- Asistir con exámenes previos si tiene (no aplica para pacientes hospitalizados y urgencias)

Requisitos

- Debe presentarse en ventanilla de admisiones del servicio de Radiología con 30 minutos de anticipación a la hora de la cita de con orden médica y autorización vigente del procedimiento

- Para pacientes hospitalizados y urgencias se indicará preparación, previo llamado del servicio

TAC DE ÓRBITAS CONTRASTADO

Preparación para el examen

- Debe asistir con ayuno de 8 horas
- Debe traer pruebas de función renal (creatinina y Bun) para realizar depuración
- En caso que el valor de la depuración salga inferior al control establecido se debe nefroproteger al paciente

El protocolo de nefroprotección indicado es:

- Ingerir un vaso con agua 24 horas antes del examen cada 2 horas
- Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con agua 12 horas antes del examen
- Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con agua 6 horas antes del examen
- Si el paciente es diabético y toma un medicamento llamado METFORMINA (glucophague) debe suspenderlo 24 horas antes
- Se debe realizar un nuevo examen 48 horas después de la inyección de medio de contraste para verificar que los valores de creatinina no se hayan alterado, si la creatinina es normal puede volver a consumir el medicamento (metformina), si se ve alterado el resultado de la creatinina (mayor al rango normal) el paciente debe consultar con su médico tratante para que este le estabilice los valores de función

- Para realizar el procedimiento el paciente requiere un acceso venoso periférico de grueso calibre; este acceso se realizara en el servicio de radiología para pacientes ambulatorios

- Para pacientes hospitalizados o de urgencias el acceso venoso se realizara con las características nombradas por parte del servicio solicitante

- Asistir con exámenes previos si tiene (no aplica para pacientes hospitalizados y urgencias)

Requisitos

- Debe presentarse en ventanilla de admisiones del servicio de Radiología con 30 minutos de anticipación a la hora de la cita de con orden médica y autorización vigente del procedimiento

- Para pacientes hospitalizados y urgencias se indicará preparación, previo llamado del servicio

TAC DE CUELLO CON CONTRASTE

Preparación para el examen

- Debe asistir con ayuno de 8 horas
- Debe traer pruebas de función renal (creatinina y Bun) para realizar depuración
- En caso que el valor de la depuración salga inferior al control establecido se debe nefroproteger al paciente

El protocolo de nefroprotección indicado es*:*

- Ingerir un vaso con agua 24 horas antes del examen cada 2 horas
- Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con agua 12 horas antes del examen
- Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con agua 6 horas antes del examen
- Si el paciente es diabético y toma un medicamento llamado METFORMINA (glucopague) debe suspenderlo 24 horas antes
- Se debe realizar un nuevo examen 48 horas después de la inyección de medio de contraste para verificar que los valores de creatinina no se hayan alterado, si la creatinina es normal puede volver a consumir el medicamento (metformina), si se ve alterado el resultado de la creatinina (mayor al rango normal) el paciente debe consultar con su médico tratante para que este le estabilice los valores de función

PREPARACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS DE RADIOLOGÍA

- Para realizar el procedimiento el paciente requiere un acceso venoso periférico de grueso calibre; este acceso se realizara en el servicio de radiología para pacientes ambulatorios

- Para pacientes hospitalizados o de urgencias el acceso venoso se realizara con las características nombradas por parte del servicio solicitante

Requisitos

- Debe presentarse en ventanilla de admisiones del servicio de Radiología con 30 minutos de anticipación a la hora de la cita de con orden médica y autorización vigente del procedimiento

- Para pacientes hospitalizados y urgencias se indicará preparación, previo llamado del servicio

- Asistir con exámenes previos si tiene (no aplica para pacientes hospitalizados y urgencias)

TAC DE TÓRAX CON CONTRASTE

Preparación para el examen

- Asistir con exámenes previos si tiene (no aplica para pacientes hospitalizados y urgencias)
- Debe asistir con ayuno de 8 horas
- Debe traer pruebas de función renal (creatinina y Bun) para realizar depuración
- En caso que el valor de la depuración salga inferior al control establecido se debe nefroproteger al paciente

El protocolo de nefroprotección indicado es:

- Ingerir un vaso con agua 24 horas antes del examen cada 2 horas
- Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con agua 12 horas antes del examen
- Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con agua 6 horas antes del examen
- El día de la cita del examen debe traer exámenes anteriores que se le hayan realizado
- Debe asistir con ayuno de 8 horas
- Si el paciente es diabético y toma un medicamento llamado METFORMINA (glucopague) debe suspenderlo 24 horas antes

- Se debe realizar un nuevo examen 48 horas después de la inyección de medio de contraste para verificar que los valores de creatinina no se hayan alterado, si la creatinina es normal puede volver a consumir el medicamento (metformina), si se ve alterado el resultado de la creatinina (mayor al rango normal) el paciente debe consultar con su médico tratante para que este le estabilice los valores de función

- Para realizar el procedimiento el paciente requiere un acceso venoso periférico de grueso calibre; este acceso se realizara en el servicio de radiología para pacientes ambulatorios

- Para pacientes hospitalizados o de urgencias el acceso venoso se realizara con las características nombradas por parte del servicio solicitante

Requisitos

- Debe presentarse en ventanilla de admisiones del servicio de Radiología con 30 minutos de anticipación a la hora de la cita de con orden médica y autorización vigente del procedimiento

- Para pacientes hospitalizados y urgencias se indicará preparación, previo llamado del servicio.

TAC DE ABDOMEN CON CONTRASTE

Preparación para el examen

- Asistir con exámenes previos si tiene (no aplica para pacientes hospitalizados y urgencias)
- Debe asistir con ayuno de 8 horas
- Debe traer pruebas de función renal (creatinina y Bun) para realizar depuración
- En caso que el valor de la depuración salga inferior al control establecido se debe nefroproteger al paciente

El protocolo de nefroprotección indicado es:

- Ingerir un vaso con agua 24 horas antes del examen cada 2 horas.
- Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con agua 12 horas antes del examen
- Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con agua 6 horas antes del examen
- El paciente o acompañante debe traer 2 botellas de agua de 500 mililitros cada una, se les adicionara 15 mililitros de medio de contraste hidrosoluble a cada botella
- Para pacientes hospitalizados o de urgencias la preparación será entregada a la Jefe del servicio encargada
- El día de la cita del examen debe traer exámenes anteriores que se le hayan realizado

- Debe asistir con ayuno de 8 horas

- Si el paciente es diabético y toma un medicamento llamado METFORMINA (glucopague) debe suspenderlo 24 horas antes

- Se debe realizar un nuevo examen 48 horas después de la inyección de medio de contraste para verificar que los valores de creatinina no se hayan alterado, si la creatinina es normal puede volver a consumir el medicamento (metformina), si se ve alterado el resultado de la creatinina (mayor al rango normal) el paciente debe consultar con su médico tratante para que este le estabilice los valores de función

- Para realizar el procedimiento el paciente requiere un acceso venoso periférico de grueso calibre; este acceso se realizara en el servicio de radiología para pacientes ambulatorios

- Para pacientes hospitalizados o de urgencias el acceso venoso se realizara con las características nombradas por parte del servicio solicitante

Requisitos

- Debe presentarse en ventanilla de admisiones del servicio de Radiología con 30 minutos de anticipación a la hora de la cita de con orden médica y autorización vigente del procedimiento

- Para pacientes hospitalizados y urgencias se indicará preparación, previo llamado del servicio.

TAC DE ABDOMEN SIMPLE (UROTAC)

Preparación para el examen

- Tener vejiga llena

Requisitos

- Debe presentarse en ventanilla de admisiones del servicio de Radiología con 30 minutos de anticipación a la hora de la cita de con orden médica y autorización vigente del procedimiento
- Para pacientes hospitalizados y urgencias se indicará preparación, previo llamado del servicio.
- Asistir con exámenes previos si tiene (no aplica para pacientes hospitalizados y urgencias)

ANGIOTAC CEREBRAL Y VASOS DEL CUELLO

Preparación para el examen

- Asistir con exámenes previos si tiene (no aplica para pacientes hospitalizados y urgencias)
- Debe asistir con ayuno de 8 horas
- Debe traer pruebas de función renal (creatinina y Bun) para realizar depuración
- En caso que el valor de la depuración salga inferior al control establecido se debe nefroproteger al paciente

El protocolo de nefroprotección indicado es:

- Ingerir un vaso con agua 24 horas antes del examen cada 2 horas
- Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con agua 12 horas antes del examen
- El día del examen asistir con vejiga llena
- Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con agua 6 horas antes del examen
- El día de la cita del examen debe traer exámenes anteriores que se le hayan realizado
- Debe asistir con ayuno de 8 horas

- Si el paciente es diabético y toma un medicamento llamado METFORMINA (glucopague) debe suspenderlo 24 horas antes

- Se debe realizar un nuevo examen 48 horas después de la inyección de medio de contraste para verificar que los valores de creatinina no se hayan alterado, si la creatinina es normal puede volver a consumir el medicamento (metformina), si se ve alterado el resultado de la creatinina (mayor al rango normal) el paciente debe consultar con su médico tratante para que este le estabilice los valores de función

- Para realizar el procedimiento el paciente requiere un acceso venoso periférico de grueso calibre; este acceso se realizara en el servicio de radiología para pacientes ambulatorios

- Para pacientes hospitalizados o de urgencias el acceso venoso se realizara con las características nombradas por parte del servicio solicitante

Requisitos

- Debe presentarse en ventanilla de admisiones del servicio de Radiología con 30 minutos de anticipación a la hora de la cita de con orden médica y autorización vigente del procedimiento

- Para pacientes hospitalizados y urgencias se indicará preparación, previo llamado del servicio

ANGIOTAC DE TÓRAX

Preparación para el examen

- Asistir con exámenes previos si tiene (no aplica para pacientes hospitalizados y urgencias)
- Debe asistir con ayuno de 8 horas
- Debe traer pruebas de función renal (creatinina y Bun) para realizar depuración
- En caso que el valor de la depuración salga inferior al control establecido se debe nefroproteger al paciente

El protocolo de nefroprotección indicado es:

- Ingerir un vaso con agua 24 horas antes del examen cada 2 horas
- Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con agua 12 horas antes del examen
- El día del examen asistir con vejiga llena
- Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con agua 6 horas antes del examen
- El día de la cita del examen debe traer exámenes anteriores que se le hayan realizado
- Debe asistir con ayuno de 8 horas

- Si el paciente es diabético y toma un medicamento llamado METFORMINA (glucopague) debe suspenderlo 24 horas antes

- Se debe realizar un nuevo examen 48 horas después de la inyección de medio de contraste para verificar que los valores de creatinina no se hayan alterado, si la creatinina es normal puede volver a consumir el medicamento (metformina), si se ve alterado el resultado de la creatinina (mayor al rango normal) el paciente debe consultar con su médico tratante para que este le estabilice los valores de función

- Para realizar el procedimiento el paciente requiere un acceso venoso periférico de grueso calibre; este acceso se realizara en el servicio de radiología para pacientes ambulatorios

- Para pacientes hospitalizados o de urgencias el acceso venoso se realizara con las características nombradas por parte del servicio solicitante

Requisitos

- Debe presentarse en ventanilla de admisiones del servicio de Radiología con 30 minutos de anticipación a la hora de la cita de con orden médica y autorización vigente del procedimiento

- Para pacientes hospitalizados y urgencias se indicará preparación, previo llamado del servicio

ANGIOTAC DE ABDOMEN

Preparación para el examen

- Asistir con exámenes previos si tiene (no aplica para pacientes hospitalizados y urgencias)
- Debe asistir con ayuno de 8 horas
- Debe traer pruebas de función renal (creatinina y Bun) para realizar depuración
- En caso que el valor de la depuración salga inferior al control establecido se debe nefroproteger al paciente

El protocolo de nefroprotección indicado es:

- Ingerir un vaso con agua 24 horas antes del examen cada 2 horas
- Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con agua 12 horas antes del examen
- El día del examen asistir con vejiga llena
- Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con agua 6 horas antes del examen
- El día de la cita del examen debe traer exámenes anteriores que se le hayan realizado
- Debe asistir con ayuno de 8 horas

- Si el paciente es diabético y toma un medicamento llamado METFORMINA (glucopague) debe suspenderlo 24 horas antes

- Se debe realizar un nuevo examen 48 horas después de la inyección de medio de contraste para verificar que los valores de creatinina no se hayan alterado, si la creatinina es normal puede volver a consumir el medicamento (metformina), si se ve alterado el resultado de la creatinina (mayor al rango normal) el paciente debe consultar con su médico tratante para que este le estabilice los valores de función

- Para realizar el procedimiento el paciente requiere un acceso venoso periférico de grueso calibre; este acceso se realizara en el servicio de radiología para pacientes ambulatorios

- Para pacientes hospitalizados o de urgencias el acceso venoso se realizara con las características nombradas por parte del servicio solicitante

Requisitos

- Debe presentarse en ventanilla de admisiones del servicio de Radiología con 30 minutos de anticipación a la hora de la cita de con orden médica y autorización vigente del procedimiento

- Para pacientes hospitalizados y urgencias se indicará preparación, previo llamado del servicio